




LASER RÉTINIEN
ou PHOTOCOAGULATION
À L'ARGON



CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE
DES LAURENTIDES

Si vous n'êtes pas en mesure de vous présenter à votre rendez-vous, veuillez nous appeler **au moins 24 heures à l'avance.**



Clinique d'ophtalmologie des Laurentides
6110, rue Doris-Lussier, Bureau 301
Boisbriand, Québec
J7H 0E8


Téléphone: **450.419.6345** ou
1.888.419.6345
Télécopieur: **450.434.9389**
institutdeloeil.com



LASER RÉTINIEN OU PHOTOCOAGULATION À L'ARGON

DÉFINITION

Le Laser Argon est une lumière colorée, à haute énergie, qui est dirigée sur la rétine. En atteignant la rétine, le Laser Argon est transformé en chaleur concentrée pour faire le traitement.



LE LASER ARGON EST UTILISÉ POUR:

- Détruire des vaisseaux sanguins ou des tissus anormaux.
- Diminuer l'enflure.
- Solidifier le pourtour des zones fragiles.

LES MALADIES TRAITÉES PAR LE LASER ARGON SONT :

- La rétinopathie diabétique.
- L'Œdème maculaire.
- La dégénérescence maculaire.
- La thrombose veineuse.
- La rétinopathie séreuse centrale.
- La déchirure ou des zones rétiniennes fragiles.

RAPPELEZ-VOUS QUE :

- Le Laser Argon a pour fonction de stabiliser, d'améliorer ou de prévenir la perte de vision.
- La réponse au traitement est variable pour chaque personne.
- Selon votre problème, l'absence de traitement peut entraîner une perte de vision partielle ou complète.
- Les complications suite à l'utilisation du laser Argon sont rares.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

- Un membre du personnel vous explique le traitement et vous fait signer un consentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
- On prépare votre œil en y instillant quelques gouttes pour dilater votre pupille (environ 25 minutes).
- Une anesthésie est ensuite faite à l'aide de gouttes ou, plus rarement, d'une injection dans la paupière inférieure.
- On vous installe ensuite au Laser Argon pour le traitement qui est fait par l'ophtalmologiste.
- Il n'y a pas ou peu de douleur lors du traitement.
- Des éblouissements sont fréquents.

APRÈS LE TRAITEMENT :

- Reprenez vos activités dès que vous vous en sentez capable.
- Si vous avez eu un traitement pour une déchirure de la rétine, restez tranquille le plus possible et suivez les consignes spéciales qu'on vous a données.
- Si on vous remet une prescription de gouttes, allez les chercher à votre pharmacie.
- Si vous sentez un mal de tête s'installer, n'hésitez pas à prendre vos analgésiques habituels.
- Si vous avez un pansement sur l'œil, ne l'enlevez que 6 heures après le traitement ou le lendemain matin.
- La dilatation de la pupille dure habituellement de 6 à 12 heures. Cette dilatation occasionne temporairement un embrouillement de la vision. Par conséquent, si les 2 yeux sont traités en même temps, attendez le lendemain avant de conduire.
- Portez des verres fumés, au besoin.
- Un prochain rendez-vous sera organisé selon le besoin.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

Effets temporaires :

- Éblouissement ou inconfort oculaire pendant 15 minutes (rarement quelques semaines).
- Diminution de votre vision pendant quelques heures ou quelques jours (rare).
- Difficultés à faire la mise au point de près pour quelques semaines.
- Maux de tête pour quelques heures (rarement plus de 2 jours, surtout si vous avez eu une injection).

Effets permanents :

- Diminution de la vision.
- Diminution du champ de vision périphérique.

N.B. Les effets permanents sont rares et surtout en lien avec des traitements à répétition ou pour de grandes déchirures rétinienne.


URGENCE

450.419.6345

1.888.419.6345

**Consultez-nous
RAPIDEMENT si
vous développez
des symptômes
qui dépassent
les délais
mentionnés.**

POUR NOUS JOINDRE



Clinique d'ophtalmologie des Laurentides
6110, rue Doris-Lussier, Bureau 301
Boisbriand, Québec
J7H 0E8

Téléphone : 450.419.6345 ou
1.888.419.6345

* Tous les prix sont sujets
à changement sans préavis.

Version novembre 2020



CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE
DES LAURENTIDES