


**IRIDOTOMIE**  
AU LASER



CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE  
DES LAURENTIDES

Si vous n'êtes pas en mesure de vous  
présenter à votre rendez-vous,  
veuillez nous appeler **au moins**  
**24 heures à l'avance**  
au **450.419.6345**.



Clinique d'ophtalmologie des Laurentides  
6110, rue Doris-Lussier  
Boisbriand, Québec  
J7H 0E8

Téléphone: **450.419.ŒIL (6345)** ou  
**1.888.419.ŒIL (6345)**

Télécopieur: **450.434.YEUX (9389)**  
[institutdeloeil.com](http://institutdeloeil.com)



# IRIDOTOMIE AU LASER

## DÉFINITION

L'iridotomie au laser est un traitement fréquemment pratiqué pour prévenir le glaucome par fermeture d'angle. Ce traitement est principalement préventif, mais il peut aussi être curatif.

L'angle irido-cornéen trop étroit décelé dans votre oeil par votre optométriste et/ou ophtalmologiste vous prédispose à faire une crise de glaucome.

Les symptômes d'une crise de glaucome peuvent se manifester par :

- Maux de tête sévères
- Douleur oculaire
- Embrouillement visuel
- Nausées
- Vomissements

**La crise de glaucome** peut entraîner une perte de vision irréversible.

L'iridotomie consiste à faire un trou microscopique à la périphérie de l'iris pour rééquilibrer la circulation de l'humeur aqueuse (liquide à l'intérieur de l'oeil).





## DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

- Un membre du personnel vous explique la procédure et vous fait signer un consentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
- Des gouttes de lopidine (0.5%) seront instillées dans votre oeil afin de prévenir une hausse de pression.
- Des gouttes de pilocarpine (1 % ou 2%) sont instillées dans votre oeil à 1 ou 2 reprises. Ce médicament provoque une constriction de votre pupille. Certaines personnes peuvent ressentir un mal de tête passager.
- Vous êtes assis face au laser.
- Une goutte anesthésiante est instillée dans votre oeil et votre tête est positionnée.
- Un verre de contact spécial est placé sur votre oeil.
- Le traitement s'effectue habituellement en moins d'une minute.
- Lors du traitement, vous pouvez ressentir de petits picotements et/ou pincements.
- Prévoyez un accompagnateur.

## APRÈS LE TRAITEMENT :

- Si vous avez mal à la tête, vous pouvez prendre de l'acétaminophène (Tylenol). Ces maux de tête peuvent durer quelques heures.
- Vous devez mettre les gouttes prescrites pour 5 jours.
- Vous pouvez reprendre vos activités le lendemain du traitement.
- Un prochain rendez-vous sera organisé.

## EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

- Votre vision est embrouillée temporairement.

## URGENCE

**450.419.6345**

**1.888.419.6345**

### **Consultez-nous RAPIDEMENT si :**

- Vous constatez l'apparition soudaine de points noirs flottants ou d'étincelles dans les jours qui suivent le traitement.
- Vous avez ou développez de la douleur qui persiste plus de 24 heures après le traitement.

## POUR NOUS JOINDRE

**CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE  
DES LAURENTIDES**



**Semaine**

**(du lundi au vendredi)**

À la Clinique d'ophtalmologie

des Laurentides

au **450.419.6345** ou

**1.888.419.6345**

**Clinique d'ophtalmologie  
des Laurentides**

6110, rue Doris-Lussier

Boisbriand, QC, J7H 0E8

\* Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.



**CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE  
DES LAURENTIDES**